



Główny Inspektorat
Weterynarii

ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Afrykański pomór świń (*African swine fever - ASF*) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia **ASF** w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF:

nagłe padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (*często z domieszką krwi*), wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.



§

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI z dnia 24
kwietnia 2024 r. w sprawie
środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru
świń**

PAMIĘTAJ !!!

utrzymuj świnie w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach

zabezpieczaj budynek przed dostępem
innych zwierząt

przed wejściami i wyjściami do i z
pomieszczeń używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
lub wyłóż maty dezynfekcyjne

przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem
i wyjazdem z gospodarstwa oraz
wybiegu używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
(niecki dezynfekcyjne lub maty
dezynfekcyjne)

karm świnie paszą zabezpieczoną przed
dostępem innych zwierząt

myj i odkażaj ręce oraz obuwie

używaj dedykowanej do prac tylko przy
świniach odzieży oraz obuwia roboczego

myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do
obsługi świń minimum raz dziennie

zwalczaj gryzonie

STOSUJ ZAKAZY !!!

karmienia świń zielonką lub ziarnem
pochodzącym z obszarów objętych
ograniczeniami II, III (**chyba że** zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
**składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 30 dni**)

wykorzystywania słomy na ściółkę
pochodzącej z obszarów objętych
ograniczeniami II i III (**chyba że** zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
**składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 90 dni**)

obsługi świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 48 godzin uczestniczyły w
polowaniu lub odłowie zwierząt łownych

wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz,
produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z dzików oraz
materiałów i przedmiotów, które mogły
zostać skażone wirusem ASF

wchodzenia osobom postronnym do
budynków, w których są utrzymywane
świnie

pożyczania sprzętu do obsługi świń do
innych gospodarstw